

กัญชากับการรักษาโรค

1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

2. โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา

3. โรคภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

4. โรคอัลไซเมอร์

5. โรคพาร์กินสัน

6. โรคภาวะนอนไม่หลับ

7. โรควิตกกังวล



ห้ามใช้




- ผู้ที่แพ้กัญชา
- เด็ก หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
- ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
- มีประวัติทางจิตเวช
- ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด วาร์ฟาริน



ใช้อย่างระมัดระวัง

- ตับและไตทำงานบกพร่อง
- ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
- ผู้สูงอายุ
- ใช้ร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์กับสมองส่วนกลาง



กองสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
อบจ.บึงกาฬ